

Bloqueo analgésico de facetas lumbares

¿Qué aplicaciones clínicas posee y como la utilizamos?

El dolor lumbar provocado por artrosis de la articulaciones situadas en la parte posterior de las vértebras (interapofisarias o interfacetarias) es muy rebelde a los tratamientos convencionales. La inyección de sustancias anestésicas y antiinflamatorias en la proximidad de estas articulaciones puede mejorar ostensiblemente y de forma prolongada el dolor.

¿Dónde se realiza?

En la Clínica del Dolor, mediante un procedimiento muy simple. Con monitorización de TA, pulso, y pO₂ se procede a la inyección de anestesia y prednisolona en la región de las facetas. Tras la técnica, se permanecen unos 15 minutos en la Clínica y se puede regresar a casa, sin ningún problema.

¿Que riesgos tiene?

La administración la realiza personal muy experimentado y con controles de constantes, bajo supervisión médica permanente, por lo que los riesgos son escasos. Se han observados algunos casos de dolor en la zona o hematoma leve que son transitorios y rara vez obligan a tomar medidas especiales.

¿Hay alternativas?

Cualquier otro tratamiento o procedimiento de tratamiento del dolor puede ser eficaz, de manera aislada o combinado con otras medidas. De todas formas, en su caso, consideramos que este tratamiento es el más indicado en el momento actual

¿Cuanto cuesta el procedimiento?

El coste total es de 250 euros. En esta cantidad va incluido la consulta médica, monitorización de TA, pulso, electrocardiograma y pO₂, la realización de la técnica, la vigilancia clínica durante y posterior, el material fungible de un solo uso y los productos farmacológicos administrados.